

更多检测 更多爱

胆汁酸检测指引
肝脏检测的最灵敏指标

skyla VB1

兽医专用生化分析仪

宠物的最佳守护者



台湾光宝集团 (LITEON)

- 1975年：公司创建，光电产品、信息科技、储存装置、手持式机构件等皆居全球领先地位
- 2014年：自主知识产权全自动智能生化分析仪VB1上市
- 2017年：集团全球销售额：72亿美元
- 2018年：汤森路透《全球科技百强企业》
- 2018年：胰脏脂肪酶检测试剂盘火热上市

愿景：成为世界级卓越公司

使命：在我们从事的行业中成为领导者

信念：「客户满意」、「卓越的执行力」、「创新」与「诚信」



北京中联保科技有限责任公司

地址：北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A-803室

电话：010-56421996 62115080

18611552845 18632680312 18610012562

15232788878 18600645689 18611557524

网址：www.bjccac.com

胆汁酸 Bile Acid 检测指引

- 定量的胆汁酸试验是最敏感，最容易操作，最针对肝脏特异性的肝功能测验。可用于：
 1. 评估肝功能
 2. 识别隐匿性肝病
 3. 当测值正常时，可帮助排除肝门脉分流
 4. 监视治疗的反应
- 胆汁酸是最有用的肝功能检验之一，正常状况下，血清中的胆汁酸浓度是非常低的，但当有明显肝脏功能障碍、或胆汁郁滞(大部份的肝病都会发生肝内的胆汁郁滞)、或门脉系统分流时，就会造成血清中胆汁酸的浓度异常上升，在饭后特别明显。
- 禁食及(或)饭后的胆汁酸若异常地上升时，就表示门脉系统分流或胆汁郁滞。
- 血清胆汁酸是比血清胆红素或白蛋白更灵敏的肝功能指针，往往在肝功能恢复正常前血清胆汁酸已恢复正常。

胆汁酸 Bile Acid 检测判读

- Postprandial Results 饭后结果
- Pre-prandial Results 饭前结果

检测单位： $\mu\text{mol/L}$

	判读结果	覆检建议
Postprandial Results 饭后结果 <12	<12 肝功能正常	
	12~25 动物无黄疸或怀疑肝功能异常	#请覆检  (数天至数周后)
	>25 疑似肝功能下降，动物无黄疸或怀疑肝功能异常	#请覆检  (数天至数周后) 并检测其他项目

Postprandial Results

饭后结果

12~25

判读结果

覆检建议

<12	动物无黄疸或怀疑肝功能异常	#请覆检 (数天至数周后)
12~25	动物无黄疸或怀疑肝功能异常	#请覆检 (数天至数周后)
>25	动物无黄疸或怀疑肝功能异常	#请覆检 (数天至数周后)

Postprandial Results

饭后结果

>25

判读结果

覆检建议

<12	肝功能持续下降	
12~25	肝功能持续下降	
>25	肝功能持续下降	

📌 检测注意事项

#一般来说,胆汁酸的检测结果为饭后>饭前。

#若是饭前检测结果>饭后检测结果,则是因为自发性胆囊萎缩或检体未确实饭前空腹。

#采血前请务必确认动物饭前(空腹时间)与饭后时间,避免因检测结果造成误判。正确的样本采集是采取禁食12小时后的血液(饭前),并于喂食12小时后再采取一次血液(饭后)。